

# '25년 3월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과

경기바다 표층해수 방사능 정기 조사결과를 아래와 같이 보고드립니다.

## □ 조사 개요

- 조사일자 : 2025. 3. 5.
- 채취장소 : 화성방조제, 풍도 인근
- 분석항목 : 총 3항목 ( $^{131}\text{I}$ ,  $^{134}\text{Cs}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ )
- 분석과정 : 표층 해수 시료채취(연안) → 전처리 → 장비분석  
※ KINS(한국원자력안전기술원) 해양환경방사능조사 보고서 참조

## □ 조사 결과

- 국내바다 세슘 $^{137}\text{Cs}$ 농도 범위(0.54 ~ 3.63mBq/kg)로 "평년 수준"  
- 두 지점 모두 미량 '검출'


단위 : mBq/kg

구 분	조사결과(방사성 핵종)			비 고
	$^{131}\text{I}$ (요오드131)	$^{134}\text{Cs}$ (세슘134)	$^{137}\text{Cs}$ (세슘137)	
화성방조제	<78.95	<0.54	2.29±0.49 (<0.82)	
풍도 인근	<79.59	<0.59	2.40±0.48 (<0.81)	

- \* < : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값으로 방사능 기기분석 상 "불검출"을 의미
- \* 최소검출가능농도(MDA) : 방사능계측기, 시료량, 회수율, 계측시간 등의 계측조건에 따라 정해지는 검출가능한 최소방사능 농도
- \* 세슘-137은 세계 보건기구(WHO)가 정하고 있는 먹는 물 기준(세슘-137 10Bq/L) 보다 훨씬 낮음  
(단위 환산 : 1Bq/kg = 1,000mBq/kg)

## □ 향후 계획

- 해수 방사능 분석 결과 "연구소 누리집에 게재" 및 시군 알림
- 주변국 원전 오염수 유입 유무 등을 파악하는데 기초자료로 활용



《 표층해수 세슘 137 농도 범위 비교 》

'22~'24년 경기바다 농도범위 (해양수산자원연구소)	'15~'22년 국내바다 농도범위 (원자력안전기술원)
0.82 ~ 2.28 mBq/kg	0.54 ~ 3.63 mBq/kg

- ※ 일본원전 사고 이전(2006 ~2010년) 국내 해수 <sup>137</sup>Cs 농도 범위 : <1.19 ~ 4.04 mBq/kg
- ※ 미량 검출된 <sup>137</sup>Cs는 KINS에서 조사한 전국 해수 <sup>137</sup>Cs 농도 범위 내로 **평년적인 수치에 해당하며**, 이는 최근 국내외(중국, 일본 등) 원전 영향보다 과거 핵실험에 기인한 잔존물로 추정(KINS, 해양환경방사능조사보고서)
- ※ 원자력안전위원회고시(제2017-17호 제8조5항) : 방사성핵종이 검출되지 않는 경우 최소 검출가능농도(MDA)를 명기하고 그 미만(<)이라 표기
- ※ 원자력안전위원회고시(제2017-17호 제8조6항) : 모든 조사결과가 최소검출가능농도 미만인 경우 평상시 변동범위는 최소검출가능농도 중에서 가장 낮은 값을 명기하고 그 미만이라 표기